

# *Pápulas Perladas del Pene*

*Dr. César Barroso Tobila*

Se denominan así unas lesiones de aspecto papular de color blanquecino, poco elevados, de hasta 3 mm de diámetro, acuminadas o filiformes que se localizan en la corona del glande y en el surco blando prepucial. Se disponen en anillos o hileras, únicos o múltiples, paralelos o irregulares, aparecen en individuos entre los 20 y 30 años de edad, con una frecuencia del 20 al 25% en pacientes de una consulta especializada.

## *Sinonimia*

A estas lesiones se les conoce también con el nombre de papilomas Hirsutoides, pene veloso y con la denominación latina *Papillae Corona Glandis* o *Hirsuties papillaris Penis*.

## *Manifestaciones Clínicas*

Estas lesiones son totalmente asintomáticas, en raras circunstancias los pacientes se quejan de un prurito in situ.

## *Histología*

Se observa una mucosa ligeramente acantótica, con una submucosa fibrosa-

da e hiperplasia vascular, rasgos compatibles con un angiofibroma.

## *Diagnóstico*

El diagnóstico clínico es bastante sencillo, sin embargo se pueden confundir con glándulas sebáceas hipertróficas heterotópicas y condilomas acuminados.

## *Tratamiento*

No se necesita tratamiento pero, una electrodesecación superficial basta para eliminarlas completamente.